

Ret-He: ein stabiler Parameter zur Differential-Diagnostik eines Eisenmangels

Ret-He in Kombination mit **Ferritin** und löslichem Transferrinrezeptor **sTfR** zur **Unterscheidung** eines funktionellen Eisenmangels (z.B. bei Infektion, Dialyse) von einem echten Speichereisenmangel.

Ret-He: Reticulocyte Haemoglobin Equivalent

Retikulozyten, die Vorstufen der reifen Erythrozyten, gelangen aus dem Knochenmark ins periphere Blut, reifen innerhalb von zwei Tagen zum Erythrozyten und erlauben somit eine zeitnahe Aussage über die aktuelle Eisenversorgung der Erythropoese. Veränderungen des Eisenstatus der Erythropoese können durch die Bestimmung des Hämoglobingehaltes der Retikulozyten viel früher erkannt werden als durch die Bestimmung des Hämoglobinwertes reifer Erythrozyten, die eine Lebensdauer von ungefähr 120 Tagen haben.

Die herkömmlichen biochemischen Marker zur Untersuchung des Eisenhaushaltes wie Serumeisen, Transferrin und Ferritin sind z.B. bei einer Entzündung im Zuge einer Akutphasenreaktion oder auch bei vielen anderen Erkrankungen zum Teil so stark beeinflusst, dass eine Interpretation der Testergebnisse schwierig ist. Ret-He liefert somit ein Hilfsmittel bei der Diagnose und beim Monitoring von Eisenmangelkrankungen.

Indikationen für eine Bestimmung von Ret-He in Kombination mit Ferritin und löslichem Transferrinrezeptor:

- Differenzierung eines funktionellen Eisenmangels von einem Mangel an Speichereisen (unterschiedliche Therapieansätze!)
- Monitoring der Erythropoetin- und/oder Eisentherapie

Bei Anforderung von Ferritin und löslichem Transferrinrezeptor erfolgt die Berechnung des Ferritin-Indexes (sTfF/log Ferritin) als kostenlose Serviceleistung. Wird bei zusätzlicher Anforderung von Ret-He eine Beurteilung gemäß Eisen-Plot nach Thomas (6.Aufl., 2005) gewünscht, bitten wir um diesbezügliche Mitteilung auf dem Auftragsformular: Eisen-Plot (FEPLLOT).

Anforderung	Material	Abrechnung
Ret-He	EDTA	GOÄ 1,15 (Privat): 4,69 €* (3552) GOÄ 1,0 (IGeL): 4,08 € (3552)
Ferritin	Serum	GOÄ 1,15 (Privat): 16,76 €* (3742) GOÄ 1,0 (IGeL): 14,57 € (3742)
Lösl. Transferrinrezeptor sTfR	Serum	GOÄ 1,15 (Privat): 50,27 €* (A4069) GOÄ 1,0 (IGeL): 43,72 € (A4069)

*zzgl. einmalige Auslagen nach §10 GOÄ

Ansprechpartner: Frau Dr. med. J. Schömig-Brekner Telefon: 089 54308-0